

Jakie są objawy ospy wietrznej?

Diagnostyka ospy wietrznej i półpaśca opiera się na ocenie klinicznej zmian skórnych i zwykle nie jest trudna. Choroba zwykle rozpoczyna się okresem objawów zwiastunowych, występujących 1-2 dni przed pojawieniem się wysypki.

Do objawów tych zaliczamy:

- gorączka lub stan podgorączkowy,
- ogólne osłabienie,
- ból głowy i mięśni,
- nieżyt nosa,
- zapalenie gardła.

Następnie pojawia się swędząca wysypka pęcherzykowa na całym ciele, początkowo w postaci plamek, później grudek, na których pojawiają się niewielkie pęcherzyki wypełnione przejrzystym płynem, który z czasem mętnieje.

Po 2-3 dniach w miejscu pęcherzyków pojawiają się krostki, które goją się przez powstawanie strupów. Po odpadnięciu strupków mogą pozostawać na jakiś czas blizny i przebarwienia, które znikają bez pozostawiania trwałych śladów w większości przypadków.

Okres wylegania, czyli czas od wniknięcia wirusa do pojawienia się objawów, trwa zazwyczaj 1-3 tygodni. Kobiety w ciąży eksponowane lub podejrzane o ekspozycję na VZV powinny mieć przeprowadzoną natychmiastową diagnostykę serologiczną polegającą na oznaczeniu miana przeciwciał w klasie IgG oraz specyficznych przeciwciał przeciwko VZV.

dr n.med. Łukasz Pydyś, ginekolog-położnik