

Szczepienia mogą uchronić dziecko przed groźnymi chorobami, takimi jak WZW B czy gruźlica. Do 2-go roku życia dziecko powinno przyjąć kilka szczepionek obowiązkowych. Jakich? Przygotowaliśmy dla was kalendarz szczepień, który w prosty sposób wszystko wyjaśnia.

Zachęcamy do wydrukowania, aby był zawsze pod ręką. Wersję DO DRUKU można pobrać klikając w link poniżej:

[KALENDARZ SZCZEPIEŃ DO POBRANIA](#)

PROGRAM OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DO LAT DWÓCH (wg GIS na rok 2022)						
Program Szczepień Ochronnych do 2 roku życia (wg Programu Szczepień Ochronnych 2022)			Schemat ze szczepionką 5 w 1		Schemat ze szczepionką 6 w 1	
WIEK DZIECKA	SZCZEPIONKA OBOWIĄZKOWE	LICZBA INIEKCJI	SZCZEPIONKA SKOJARZONA 5 w 1	LICZBA INIEKCJI	SZCZEPIONKA SKOJARZONA 6 w 1	LICZBA INIEKCJI
 PIERWSZE 24 GODZINY ŻYCIA	WZW B, gruźlica	 x 2	WZW B, gruźlica	 x 2	WZW B, gruźlica	 x 2
 DRUGI MIESIĄC ŻYCIA (7-8 tydzień)	WZW B, DTP (błonica, tężec, krztusiec), Hib, pneumokoki, rotavirus (doustnie)	 x 4	WZW B, DTaP-IPV-Hib, pneumokoki, rotavirus (doustnie)	 x 3	DTaP-IPV-HBV-Hib, pneumokoki, rotavirus (doustnie)	 x 2
 TRZECI/CZWARTY MIESIĄC ŻYCIA (po 6-8 tyg od poprzedniego szczepienia)	DTP (błonica, tężec, krztusiec), poliomyelitis (IPV), Hib, pneumokoki, rotavirus (doustnie)	 x 4	DTaP-IPV-Hib, pneumokoki, rotavirus (doustnie)	 x 2	DTaP-IPV-HBV-Hib, pneumokoki, rotavirus (doustnie)	 x 2
 PIĄTY/SZÓSTY MIESIĄC ŻYCIA (po 6-8 tyg od poprzedniego szczepienia)	DTP (błonica, tężec, krztusiec), poliomyelitis (IPV), Hib, rotavirus (doustnie)	 x 3	DTaP-IPV-Hib, rotavirus (doustnie)	 x 1	DTaP-IPV-HBV-Hib, rotavirus (doustnie)	 x 1
 SIÓDMY MIESIĄC ŻYCIA	WZW B	 x 1	WZW B	 x 1	-	-
 TRZYNASTY/CZTERNASTY MIESIĄC ŻYCIA	odra, świnka, różyczka, pneumokoki	 x 2	odra, świnka, różyczka, pneumokoki	 x 2	odra, świnka, różyczka, pneumokoki	 x 2
 SZESNASTY/OSIEMNASTY MIESIĄC ŻYCIA	DTP (błonica, tężec, krztusiec), poliomyelitis (IPV), Hib	 x 3	DTaP-IPV-Hib	 x 1	DTaP-IPV-HBV-Hib	 x 1